

# FLANAX<sup>®</sup> 275 mg

## naproxeno sódico

### I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Roche

**Nome comercial:** Flanax<sup>®</sup>

**Denominação genérica:** naproxeno sódico

**Forma farmacêutica, via de administração e apresentação**

USO ORAL

Embalagens contendo 20 comprimidos revestidos

**USO ADULTO**

#### Composição

Cada comprimido de 275 mg contém:

naproxeno sódico ..... 275 mg

Excipientes: celulose microcristalina, polividona, estearato de magnésio, opadry Y-S-1-4215, talco e água purificada.

### II) INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### 1. Como este medicamento funciona?

O naproxeno sódico, substância ativa do Flanax<sup>®</sup> é um antiinflamatório (reduz a inflamação) com ação analgésica (alívio da dor) e antitérmica (reduz a febre).

#### 2. Indicações do medicamento

Flanax<sup>®</sup> é indicado para alívio da dor causada por inflamação nos casos de: dor decorrente da prática esportiva e/ou traumatismos (contusões, entorses, distensões, cotovelo do tenista), dor muscular, dor articular, dor nas costas, dor na perna, dor na coluna vertebral, dor ciática, dor de garganta, torcicolo, tendinite, bursite, dor varicosa e outras dores.

#### 3. Quando não devo usar este medicamento?

Flanax<sup>®</sup> é contra-indicado em pacientes que apresentam hipersensibilidade ao naproxeno ou naproxeno sódico, úlcera péptica gástrica ou duodenal ativa e sangramento gastrointestinal ativo.

Devido à possibilidade de reação cruzada, Flanax<sup>®</sup> não deve ser administrado a pacientes nos quais o ácido acetilsalicílico ou outros antiinflamatórios não esteroideais ou analgésicos induzam a asma, rinite, pólipos nasais ou urticária. *Este medicamento é contra-indicado na faixa etária inferior a 2 anos.*

Deve-se ter cautela com o uso de Flanax<sup>®</sup> em pacientes idosos.

Informe ao seu médico caso você tenha problemas no coração, fígado, rim ou doenças gastrointestinais.

Pacientes em dietas com restrição de sódio: levar em consideração que 1 comprimido de 275 mg de Flanax<sup>®</sup> contém 25 mg de sódio (aproximadamente 1 mEq).

Não é recomendada a administração de Flanax<sup>®</sup> com antiácidos ou colestiraminas, anticoagulantes do tipo cumarínicos, hidantoínas, sulfonamidas, sulfoniluréias, probenecida, metotrexato, beta-bloqueadores, furosemida, lítio e varfarina.

Alguns pacientes podem apresentar sonolência, tontura, vertigem, insônia ou depressão. Estes devem ter cautela ao realizar atividades que requerem atenção.

*Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.*

*Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.*

*Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.*

#### 4. Como devo usar este medicamento?

Comprimidos de 275 mg: tomar 1 comprimido, 1 a 2 vezes ao dia ou a critério médico. O comprimido deve ser ingerido com um pouco de líquido, sem mastigar.

Não é recomendado o uso de Flanax<sup>®</sup> por mais de 10 dias consecutivos, a não ser sob orientação médica.

*Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.*

*Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.*

*Este medicamento não pode ser partido ou mastigado.*

#### 5. Reações adversas

Informe ao seu médico sobre o aparecimento de reações desagradáveis tais como: náuseas, dor abdominal, dores no estômago, diarreia, azia, dor de cabeça, enxaqueca, zumbido, tonturas, sonolência, sudorese, prurido, alterações na audição e visão, falta de ar, inchaço, palpitações e sede, bem como quaisquer outros sinais ou sintomas.

#### 6. O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez?

Em caso de ingestão, acidental ou proposital, de quantidade excessiva de naproxeno sódico procurar serviço médico de urgência onde possa ser realizado esvaziamento gástrico e empregadas as medidas usuais de suporte.

#### 7. Onde e como devo guardar este medicamento?

Este medicamento deve ser conservado em temperatura ambiente (15° C a 30° C), protegido da luz e da umidade e em sua embalagem original.

*Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.*

### III) DIZERES LEGAIS

**Fabricado por:** Syntex S.A. de C.V., México

**Importado e distribuído sob licença de:**

Produtos Roche Q.F.S.A.

Estrada dos Bandeirantes, 2020 - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ 33.009.945/0023-39

**Por:** Bayer S.A.

Rua Domingos Jorge, 1000 - São Paulo - SP

Reg. MS - 1.0100.0561

Farm. Resp.: Guilherme Neves Ferreira

CRF-RJ Cart. nº 4288

**Serviço Gratuito de Informações: 0800-7720289**

**www.roche.com.br**

0000001  
0075478